Dr. Rath Research Institute

Poprawa kliniczna u chorych z czynną gruźlicą dzięki kompleksowemu leczeniu i żywieniowej suplementacji

L.V. Turchenko, E.O. Voloshchuk, V. Ivanov, T. Kalinovsky, A. Niedzwiecki, M. Rath
The Open Products natural Journal 2008; 1: 20-26

Ponowne pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie gruźlicy wielolekowej nasila się na świecie wśród ludności o obniżonej odporności. W krajach gospodarczo ubogich odnotowuje się rosnącą częstość zgonów powodowaną przez szczep bakterii gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), który jest całkowicie odporny na wszelkie dostępne standardowe terapie.

Bardzo ważne jest zachęcanie pacjentów do lepszej współpracy i poprawa wyników leczenia gruźlicy. Przeprowadziliśmy otwarte badanie kliniczne przy udziale 120 hospitalizowanych pacjentów w wieku 20-65 lat, u których zdiagnozowano czynną gruźlicę płuc. Pacjenci ci otrzymywali specjalnie opracowaną mieszankę mikroskładników odżywczych wraz ze standardowymi lekami przeciwgruźliczymi. Wyniki porównano z grupą kontrolną 100 pacjentów, niedawno leczonych w tym samym szpitalu.

Po dwóch miesiącach u 98% chorych na gruźlicę pacjentów, którzy otrzymywali mikroskładniki odżywcze, odnotowano znaczącą poprawę kliniczną w postaci szybszego gojenia się dziur w płucach (oznaka czynnej gruźlicy); w porównaniu do zaledwie 69% pacjentów w grupie kontrolnej, biorących tylko standardowe leki przeciwgruźlicze, którzy wykazali taką poprawę. Test na obecność bakterii w plwocinie był ujemny u wszystkich (100%) pacjentów w grupie testowej, podczas gdy tylko 88% pacjentów z grupy kontrolnej miało ujemny wynik testu plwociny.

Wiadomo, że standardowa terapia lekami przeciwgruźliczymi jest toksyczna dla wątroby. Może ona wpływać na współpracę pacjentów i prowadzić do śmierci z powodu niewydolności wątroby. Zaobserwowaliśmy znaczny spadek niepożądanych skutków ubocznych leków przeciwgruźliczych u pacjentów w grupie z suplementacją mikroskładnikami odżywczymi, bo tylko u 11% pacjentów odnotowano pewne skutki uboczne. Dla porównania u 46% pacjentów w grupie kontrolnej stwierdzono łagodne lub umiarkowane działania niepożądane.

Co za tym idzie, suplementacja mikroskładnikami odżywczymi nie tylko zwiększyła skuteczność standardowego leczenia gruźlicy, ale także zmniejszyła skutki uboczne związane z reżimem przyjmowania leków.